

Листівка-вкладка

Назва ветеринарного препарату

СЕВАК БРОЙЛЕР НХ К, CEVAC BROILER ND К – вакцина інактивована масляна емульгована проти ньюкаслської хвороби птиці.

Склад

Одна доза вакцини містить:

Інактивованій вірус ньюкаслської хвороби штам NDV-SZ LaSota – щонайменше $5 \log_2$ HI титр або 50 PD₅₀.

Допоміжні речовини:

Масляний ад'ювант – 0,075 мл

Тіомерсал (мертіолат) – макс. 1,25 мкг

PBS розчин (фосфатно-сольовий буферний розчин) – до 0,1 мл

Фармацевтична форма

Емульсія для ін'єкцій.

Імунобіологічні властивості

Вакцина призначена для активної імунізації курчат добового віку проти ньюкаслської хвороби (НХ). Може застосовуватись самостійно або в поєднанні з живою вакциною проти ньюкаслської хвороби. Вакцинація проводиться з профілактичною метою. Імунітет формується у курчат віком 3 тижні та триває до 6-тижневого віку.

Вид тварин

Птиця (курчата).

Показання до застосування

Вакцина призначена для активної імунізації курчат добового віку проти ньюкаслської хвороби. Може застосовуватись самостійно або в поєднанні з живою вакциною проти ньюкаслської хвороби.

Протипоказання

Не встановлені.

Застереження при застосуванні

Задовільний рівень захисту може бути досягнений лише у здорової, добре розвиненої птиці.

Для вакцинації використовують тільки стерильне обладнання.

Перед застосуванням вакцину витримують при кімнатній температурі (від 15 до 25 °C) протягом 3-4 годин.

Флакон з вакциною ретельно струшують до та під час використання.

Необхідно перевірити справність шприца для введення правильної дози.

Після відкриття флакону вміст необхідно використати протягом 24 год; в іншому випадку залишки повинні бути утилізовані.

Взаємодія з іншими засобами

Не встановлена.

Спосіб застосування та дози

Вакцинувати слід курчат добового віку підшкірно (в середній третині ший) або внутрішньом'язово (в м'язи стегна) в дозі 0,1 мл на одну особину. Перед застосуванням флакон з вакциною слід ретельно струсити. Для вакцинації використовують тільки стерильне обладнання.

Вміст відкритого флакону слід використати протягом 24 годин.

Побічні ефекти

При суворому дотриманні інструкції щодо використання жодних системних або місцевих реакцій не відмічають.

Період виведення (каренції)

0 діб.

Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу, котрі застосовують ВІП

Перед початком роботи ознайомтесь зі всіма правилами роботи з ветеринарними препаратами й ретельно їх дотримуйтесь. У разі самовведення слід негайно звернутися до лікаря.

Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним ВІП, способи його знешкодження і утилізації

Утилізацію усіх відкритих під час проведення процедури вакцинації флаконів з вакциною слід здійснювати у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Термін придатності

24 місяці.

Вміст відкритого флакону слід використати протягом 24 годин.

Умови зберігання і транспортування

У захищеному від світла місці за температури від 2 до 8 °С. Не заморожувати.

Упаковка

Пластикові флакони по 100 та 500 мл, закорковані гумовими пробками й завальцьовані алюмінієвими ковпачками.

Назва, місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення

Сева Санте Анімаль, 8 рю де Логроньо, 33500 Лібурн, Франція.

Назва, місцезнаходження виробника

Сева-Філаксія Ветеринарі Байолоджикалс Ко Лтд, 1107 Будапешт, Сзаллас 5, Угорщина.

Правила відпуску

За рецептом.

Додаткова інформація

Якщо препарат не відповідає вимогам листівки-вкладки або виникли ускладнення, застосування цієї серії негайно припиняють і повідомляють Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ) та постачальника (виробника). Одночасно з посланцем у ДНКІБШМ направляють, відповідно до “Вказівки про порядок пред’явлення рекламаций на біологічні препарати, що призначені для застосування у ветеринарній медицині” від 03.06.98 № 2 три нерозкриті флакони цієї серії препарату за адресою 03151, м. Київ, вул. Донецька, 30, ДНКІБШМ.