

Листівка-вкладка

Назва ветеринарного препарату

ФЕБРИВАК 3-ПЛЮС (FEBRIVAC 3-PLUS) - вакцина інактивована адсорбована проти вірусного ентериту, ботулізму і геморагічної пневмонії норок.

Склад

Одна доза (1,0 мл) містить:

Активні речовини:

- | | |
|---|--|
| -інактивованій парвовірус норок, штам E-mink-FI | не менше $10^{4.0}$ ТКІД ₅₀ * |
| -анатоксин <i>Clostridium botulinum</i> типу С, штам Stockholm | не менше 0,5 rU*(¹) |
| -інактивовані <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , серотипи 5, 6 і 7/8 | не менше 10^8 клітин/серотип* |

(*перед інактивацією, (¹) Вміст токсинів у відносних одиницях, визначений за допомогою ELISA за внутрішнім стандартом)

Допоміжні речовини:

формальдегід, неоміцину сульфат, сироватка крові новонароджених телят

Ад'ювант: алюміній (у формі гідроксиду) не більше. 7,5 мг

Фармацевтична форма

Суспензія для ін'єкцій

Імунобіологічні властивості

АТСvet код: QI20CL01. Фармакотерапевтична група: інактивована вірусна та бактеріальна вакцина. Вакцина застосовується для стимуляції активного імунітету у норок проти вірусного ентериту, ботулізму та геморагічної пневмонії, а також як профілактичний засіб проти інтоксикації *Clostridium botulinum* типу С.

Вакцинація призводить до формування ефективного імунітету у тварин, що зберігається протягом 1 року.

Профілактична імунізація норок проти вірусу ентериту, особливо молодих тварин віком від 6 тижнів, призводить до формування ефективного імунітету.

За допомогою своєчасної вакцинації можна ефективно боротися з інтоксикацією *Clostridium botulinum* токсином типу С у норок.

Геморагічну пневмонію неможливо успішно вилікувати через стійкість інфекції до антибіотиків. Профілактична вакцинація захищає поголів'я норок від більш ніж 90 % серотипів, виявлених у поточних випадках захворювання.

При метафілактичному застосуванні смертність може бути знижена до нуля через 5-6 днів після імунізації.

Вид тварин

Норки (*Mustela vison*)

Показання до застосування

Для активної імунізації норок проти вірусного ентериту, ботулізму і геморагічної пневмонії.

Протипоказання

Не використовувати для вакцинації клінічно хворих або ослаблених тварин, особливо після транспортування або переміщення / перегрупування, а також для вакцинації вагітних самок.

Застереження при застосуванні

Перша вакцинація цуценят повинна проходити не раніше, ніж після досягнення 6-тижневого віку, тому що утворення імунітету може залежати від присутності материнських антитіл.

Не змішувати з іншими вакцинами або імунологічними препаратами.

Взаємодія з іншими засобами

Представлені дані з безпеки та ефективності показують, що вакцина може застосовуватися разом з ФЕБРИВАК ДІСТ (FEBRIVAC DIST) в той же день, але без змішування.

Відсутня жодна інформація щодо безпеки і ефективності цієї вакцини при застосуванні з будь-яким іншим ветеринарним препаратом, за винятком вже зазначеного вище препарату.

Таким чином, необхідно приймати рішення щодо застосування цієї вакцини до або після застосування будь-якого іншого ветеринарного препарату індивідуально в кожному окремому випадку.

Особливі вказівки при вагітності, лактації

Вагітність і лактація: Не рекомендується застосування під час вагітності або лактації.

Репродуктивна функція: Племінним тваринам роблять щеплення за чотири тижні до початку спарювання.

Спосіб застосування та дози

Перед застосуванням флакон з вакциною слід ретельно збовтати.

Базова імунізація цуценят:

Разова доза 1 мл вводиться підшкірно не раніше, ніж у віці між 6 і 8 тижнями. Якщо на першу вакцинацію впливає присутність материнських антитіл, то можна повторити вакцинацію з інтервалом 3-5 тижнів.

Племінні тварини:

Вакцинація, принаймні за чотири тижні до початку спарювання.

Рекомендується щорічна ревакцинація.

Побічні ефекти

В місці ін'єкції дуже часто може виникати дифузний жорсткий або м'який набряк (максимальний діаметр 1,5 см), який, як правило, зникає протягом 6 тижнів без лікування.

Особливу увагу слід приділяти гігієні вакцинації і підшкірної ін'єкції.

Період виведення (каренції)

Не застосовується для продуктивних тварин.

Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу, які застосовують ВІП

Персонал, який працює з препаратом, повинен дотримуватись основних правил гігієни та безпеки, прийнятих при роботі з ветеринарними препаратами.

В разі випадкового введення вакцини обов'язково звернутись за медичним оглядом.

Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним ВІП, способи його знешкодження і утилізації

Невикористану вакцину або вакцину, у якої закінчився термін придатності, знешкоджують кип'ятінням протягом 30 хвилин або автоклавують при 120 °C протягом 45-60 хвилин.

Термін придатності

Термін придатності – 2 роки

Відкритий флакон необхідно використати протягом 8 годин.

Умови зберігання і транспортування

Зберігати в сухому, темному місці за температури від + 2 °C до + 8 °C. Зберігати в захищеному від світла місці. Не заморожувати.

Упаковка

Вакцина фасована в флакони для ін'єкцій об'ємом 250 мл, виготовлені з поліетилену підвищеної щільності, які закриті пробками для ін'єкційних пляшок.

Назва та місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення і

СіЗет Ваксінес С.А.У., А Рельва с/н – Торнейрос, 36410 О Поррінью, Понтеведра, Іспанія

Назва та місцезнаходження виробника

ІДТ Біологіка ГмбХ (IDT Biologika GmbH), Ам Фармапарк, 06861, Дессау-Росслау, Німеччина

Додаткова інформація

Якщо препарат не відповідає вимогам листівки-вкладки або виникли ускладнення, застосування цієї серії негайно припиняють і повідомляють Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (ДНДІЛДВСЕ) та постачальника (виробника). Одночасно з посланцем у ДНДІЛДВСЕ направляють, відповідно до "Вказівки про порядок пред'явлення реклаमाцій на біологічні препарати, що призначені для застосування у

Продовження додатку 2
до реєстраційного посвідчення
№
від

ветеринарній медицині” від 03.06.98 № 2 три нерозкриті флакони цієї серії препарату за адресою 03151, м. Київ, вул. Донецька, 30, ДНДІЛДВСЕ.