

Листівка-вкладка

Назва ветеринарного препарату

ТАбік IBVAR206, TABіc IBVAR206 – вакцина жива проти інфекційного бронхіту із штаму 06.

Склад

Активнодіюча речовина:

вірус інфекційного бронхіту птиці, штам 06 – $10^{3,2}$ - $10^{4,4}$ ЕІД₅₀/дозу.

Допоміжні речовини:

трехалоза – 0,08 мг/мл

гідрокарбонат натрію – 0,36-0,45 г/таб.

безводна лимонна кислота – 0,25-0,31 г/таб.

стеарат магнію – $2,05 \times 10^{-3}$ г/таб.

Фармацевтична форма

Розчинна таблетка.

Імунобіологічні властивості

Вакцина формує у птиці імунітет проти інфекційного бронхіту. Імунітет формується протягом 21 дня після вакцинації і триває протягом періоду вирощування.

Вид тварин

Кури.

Показання до застосування

Для активної вакцинації бройлерів, племінної та яєчної птиці проти інфекційного бронхіту. Вакцину можна застосовувати з першої доби життя.

Протипоказання

Не застосовувати для хворої птиці. Не застосовувати таблетки з пошкоджених секцій блістера. Не зменшувати дозу вакцини. Не розчиняти у воді зі слідами дезінфектантів або детергентів.

Застереження при застосуванні

Таблетку з вакциною необхідно розчиняти тільки в чистій холодній (6-10°C) кип'яченій воді. Вакцинацію проводять тільки після повного розчинення таблетки. Розчин з вакциною потрібно використати протягом 3 годин після розведення.

Взаємодія з іншими засобами

Вакцину застосовують для добових курчат в поєднанні з вакциною проти ньюкаслської хвороби в день вакцинації.

Особливі вказівки при несучості

Не застосовувати за 4 тижні до початку та під час несучості.

Спосіб застосування та дози

Вакцину вводять спреєм-методом, аерозольно або інтраокулярним методом.

Ревакцинацію рекомендується проводити у віці 12-15 діб. Для племінної та яєчної птиці можливе проведення подальшої ревакцинації, в залежності від рішення лікаря.

Вода для вакцинації повинна бути чистою холодною (6-10°C) кип'яченою з рН 5,5-7,5. Для нейтралізації хлору у питній воді застосовується промисловий нейтралізатор хлору згідно з інструкцією або додавання на 1 л води 50 мл знежиреного молока або 5 г порошку знежиреного молока. Після розчинення молока необхідно почекати 5 хвилин, а потім додати вакцину.

Для приготування вакцинного розчину натиснути на блістер, щоб вивільнити таблетку у воду. Почекаати, доки таблетка повністю розчиниться з вивільненням газу. Після досягнення повного розчинення через 1-2 хвилини, обережно перемішати для забезпечення однорідної дисперсії вакцини.

Спрей-метод

Спрей-метод застосовується курчатам добового віку в інкубаторі або у пташнику. Для розпилення вакцини використовується автоматичний розпилювач, який спрацьовує, коли ящик з курчатами їде по ланцюгу. Також можна застосовувати розпилювач з ручним керуванням. Діаметр крапель

повинен бути приблизно 150-200 мк. У результаті розпилення птахи повинні бути повністю змочені.

Спрей-методом розчин потрапляє в очі та рот птахів. Птахи збирають краплі також із пір'я інших птахів, що дозволяє вакцині потрапити і в горло. 20-30 мл води має містити 100 доз вакцини, яких вистачає на ящик зі 100 курчат.

Пам'ятка перед проведенням вакцинації спреєм-методом в інкубаторі:

Переконайтесь, що обладнання є чистим, без залишків дезінфектантів і в справному стані.

Переконайтесь, що температура води становить 6-10°C. На кожні 1000 доз потрібно 250-300 мл води.

Відкалібруйте автоматичний розпилювач (або розпилювач з ручним керуванням) для розпилення крапель розміром 150-200 мк в об'ємі 25-30 мл.

Додайте блакитний барвник.

Протестуйте систему на пустій коробці, щоб переконатися в правильному розмірі крапель і рівномірному покритті коробки.

Підготовка:

Помістіть достатню кількість ліофілізату в ємкість з водою і чекайте його повного розчинення.

Налийте розчинену вакцину в резервуар для води розпилювача і обережно розмішайте.

Застосування:

Поповнюйте розчин з вакциною кожні 1,5-2 години.

Стежте за роботою випускного отвору.

Стежте за температурою води (6-10°C).

Перевірка

Перевірте якість вакцинації за наявністю блакитного барвника на пір'ї птахів та проведіть по них рукою, щоб переконатися, що птахи повністю змочені.

Після розпилення тримайте птахів, поки вони ще мокрі, в закритому, добре прогрітому приміщенні подалі від протягів.

Аерозольний метод

Вакцину розчиняють в охолодженій стерильній воді (дистильованій чи кип'яченій) в об'ємі, який залежить від застосовуваного розпилювача.

Пам'ятка перед проведенням вакцинації дрібнокрапельним методом:

Переконайтесь, що обладнання є чистим, без залишків дезінфектантів і в справному стані.

Переконайтесь, що температура води становить 6-10°C. На кожні 1000 доз потрібно 400-500 мл води.

Відкалібруйте розпилювач для розпилення крапель розміром 50-100 мк.

Перевірте розмір крапель шляхом розпилення на чистий картон.

Перевірте швидкість ходи під час розпилення води.

Підготовка:

Помістіть достатню кількість ліофілізату в ємкість з водою і чекайте його повного розчинення.

Налийте розчинену вакцину в резервуар для води розпилювача і обережно розмішайте.

Застосування:

Скупчіть птахів в одній стороні пташника.

Вимкніть вентиляцію.

Увімкніть світло.

Працівник, який проводить розпилення, повинен повільно рухатися вздовж пташника, направляючи розпилювач на висоту 50-70 см над головами птахів.

Розпилення в пташнику з кількістю голів від 25 000 до 30 000 має тривати близько 20 хвилин.

Увімкніть вентиляцію через 10-20 хв. після розпилення.

Інтраокулярний метод

Таблетку необхідно розчинити в холодній кип'яченій воді – 1000 доз вакцини розчиняють в 30-50 мл води (точна кількість води залежить від типу застосованої крапельниці). У вакцинний розчин бажано додати барвник для контролю вакцинованої птиці.

Продовження додатку 2
до реєстраційного посвідчення
№ ВА-00548-02-13
від

Тримавши птаха в одній руці, підставити його під крапельницю, щоб в око потрапила одна крапля. Після розчинення вакцину потрібно використати протягом 3 годин. Якість застосування можна перевірити по зафарбовуванню язика в синій колір.

Побічні ефекти

Відсутні.

Період виведення (каренції)

Нуль діб.

Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу, які застосовують ВП

Дотримуватись правил роботи з ветеринарними препаратами.

Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним ВП, способи його знешкодження і утилізації

Невикористаний і протермінований препарат або використані порожні флакони повинні бути утилізовані згідно місцевих вимог.

Термін придатності

21 місяць. Розчинену вакцину необхідно використати протягом 3 годин.

Умови зберігання і транспортування

Зберігати в сухому темному місці при температурі від 2°C до 8°C. Не заморожувати!

Упаковка

Таблетки по 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 8000, 9000, 10000 доз запаковані в алюмінієві блістери. Кожен блістер містить 10 таблеток. Блістер з таблетками запакований в окрему картонну коробку.

Назва та місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення і виробника

АБІК Біолоджикал Лабораторіз Лтд., вул. Хамелача 3, Вест Індастріал Зоун, Бейт-Шемеш 9905503, Ізраїль.

Додаткова інформація

Якщо препарат не відповідає вимогам листівки-вкладки або виникли ускладнення, застосування цієї серії негайно припиняють і повідомляють Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (ДНДІЛДВСЕ) та постачальника (виробника). Одночасно з посланцем у ДНДІЛДВСЕ направляють, відповідно до “Вказівки про порядок пред’явлення рекламаций на біологічні препарати, що призначені для застосування у ветеринарній медицині” від 03.06.98 № 2 три нерозкриті флакони цієї серії препарату за адресою: 03151, м. Київ, вул. Донецька, 30, ДНДІЛДВСЕ.