

Ветеринарні імунобіологічні препарати, що пропонуються для розгляду на засіданні Державної фармакологічної комісії ветеринарної медицини України 23 січня 2026 року:

Назва препарату	Фармацевтична форма	Види тварин	Склад	Власник реєстраційного посвідчення	Країна	Процедура
Рабізін, Rabisin – вакцина інактивована проти сказу тварин	Суспензія	Собаки, коти, тхори, коні, велика рогата худоба, вівці	Одна доза вакцини містить: активнодіючу речовину: глікопротеїни вірусу сказу, штам G52. $\geq 2,09 \log_{10}$ OD50* або $\geq 1 \text{ MO}^{**}$; ад'ювант: гідроокис алюмінію 1,7 мг; консервант***: тіомерсал $\leq 0,1$ мг; наповнювач додають до утворення 1 дози. * Кількість активнодіючої речовини в одиницях оптичної густини (optical density, OD) при проведенні контролю якості серії препарату in vitro методом ІФА (ELISA). ** Кількість активнодіючої речовини в міжнародних одиницях (МО) при проведенні контролю якості серії препарату згідно вимог монографії ЄФ, 451. *** Лише для упакування 1 флакон по 10 доз.	Берінгер Інгельхайм Ветмедіка ГмбХ	Німеччина	Перереєстрація
ЕНТЕРІКОЛІКС, ENTERICOLIX – вакцина інактивована проти колібактеріозу та некротичного ентериту свиней, викликаного E. Coli та C. perfringens типу C.	Емульсія	Свині (свиноматки, ремонтні свинки)	Одна доза (2 мл) інактивованої вакцини містить: Активнодіючі речовини: Escherichia coli штам P4 (адгезини F6) > 1RP* Escherichia coli штам P5 (адгезини F18ab) > 1RP* Escherichia coli штам P6 (адгезини F4ac) > 1RP* Escherichia coli штам P9 (адгезини F18ac) > 1RP* Escherichia coli штам P10 (адгезини F5 + F41) > 1RP* бета-анатоксин Clostridium perfringens типу C (CZV13) > 10 MO** β-анатоксину/мл кролячої сироватки *RP: Відносна активність для кожного антигену щодо референтної вакцини з задовільним результатом у тесті на імуногенність (стаття ЄФ 0962). **MO: Міжнародні одиниці бета-токсину (стаття	Берінгер Інгельхайм Ветмедіка ГмбХ	Німеччина	Перереєстрація

			ЄФ 0363) Допоміжні речовини: Ад'ювант: Легка мінеральна олія 0,760 мл Монтанід 103 0,0425 мл Сорбітанолеат 0,0425 мл Консервант: Тіомерсал 0,2 мг			
СЕВАК БРОЙЛЕР НХ К, CEVAC BROILER ND К – вакцина інактивована масляна емульгована проти ньюкаслської хвороби птиці	Емульсія	Птиця (курчата)	Одна доза вакцини містить: Інактивований вірус ньюкаслської хвороби штаму NDV-SZ LaSota – щонайменше 5 log ₂ HI титр або 50 PD ₅₀ . Допоміжні речовини: Масляний ад'ювант – 0,075 мл Тіомерсал (мертіолат) – макс. 1,25 мкг PBS розчин (фосфатно-сольовий буферний розчин) – до 0,1 мл	Сева Санте Анімаль	Франція	Перереєстрація
Парворувакс, Parvoruvax – вакцина асоційована інактивована проти парвовірозу та бешихи свиней.	Суспензія	Свині	Одна доза вакцини (2 мл) містить: Активуючі речовини: інактивований парвовірус свиней, штаму K22 ³ 2 HAI.U1 лізовані бактеріальні клітини Erysipelothrix rhusiopathiae, серотип 2 ³ 1 ELISA U2 Допоміжні речовини: гідроксид алюмінію (в Ag 3+) 4,2 мг тіомерсал ≤ 0,2 мг наповнювач до 2 мл 11 HAI.U: кількість, достатня для отримання титру антитіл HAI в 1 log ₁₀ у морських свинок після введення вакцини. 2 1 ELISA U: достатня кількість, щоб викликати у тварин сероконверсію (за ELISA) згідно Ph. Eur.	Сева Санте Анімаль	Франція	Перереєстрація
Бовіліс® Vista 5 L5 SQ, Bovilis® Vista 5 L5 SQ – вакцина полівалентна проти ринотрахеїту, вірусної діареї, парагрипу-3, респіраторно-	Ліофілізат та суспензія	BPX	Кожна доза вакцини (2 мл) містить активуючі компоненти: Вірус інфекційного ринотрахеїту BPX ≥ 10 ^{3,6} ТЦД*50 Вірус діареї BPX тип 1 ≥ 10 ^{3,8} ТЦД50 Вірус діареї BPX тип 2 ≥ 10 ^{3,5} ТЦД50 Вірус парагрипу 3 ≥ 10 ^{5,1} ТЦД50	Інтервет Інтернешнл Б. В.	Нідерланди	Зміни «А»

синцитіальної інфекції та лептоспірозу BPX			Вірус респіраторно-синцитіальної інфекції BPX $\geq 10^{3,8}$ ТЦД50 L. canicola (інактивована) ВА** $\geq 1,2$ L. grippotyphosa (інактивована) ВА $\geq 1,2$ L. hardjo (інактивована) ВА $\geq 1,1$ L. icterohaemorrhagiae (інактивована) ВА $\geq 1,3$ L. pomona (інактивована) ВА $\geq 1,0$ *тканинна цитопатична доза; **відносна активність (в ІФА) Ад'ювант – ЕМА/ДДА (етилен малеїновий ангідрид/диметилдіоктадециламоній) – до 10 об'єм. %. Консервант – тіомерсал – до 0,0001%. Продукт також може містити залишки стрептоміцину та пеніциліну (із культурального середовища).			
Бовіліс® Vista Once SQ, Bovilis® Vista Once SQ – вакцина жива полівалентна проти ринотрахеїту, вірусної діареї, респіраторно-синцитіальної інфекції, парагрипу-3 і пастерельозу BPX	Ліофілізат та розчинник	BPX	Кожна доза вакцини містить активні діючі компоненти (атенуйовані віруси): Вірус інфекційного ринотрахеїту BPX $\geq 10^{3,6}$ TCID*50 Вірус діареї BPX тип 1 $\geq 10^{3,8}$ TCID*50 Вірус діареї BPX тип 2 $\geq 10^{3,5}$ TCID*50 Вірус парагрипу-3 $\geq 10^{5,1}$ TCID*50 Вірус респіраторно-синцитіальної інфекції BPX $\geq 10^{3,8}$ TCID*50 Mannheimia haemolytica $\geq 1 \times 10^6$ CFU** Pasteurella multocida $\geq 8 \times 10^5$ CFU *доза інфікування 50 % тканинної культури; **колонієутворюючих одиниць. Продукт також може містити залишки стрептоміцину та пеніциліну (із культурального середовища).	Інтервет Інтернешнл Б. В.	Нідерланди	Зміни «А»
ФЕБРИВАК 3-ПЛЮС (FEBRIVAC 3-PLUS) - вакцина інактивована адсорбована проти вірусного ентериту, ботулізму і геморагічної пневмонії норок	Суспензія	Норка (Mustela vison)	Одна доза (1,0 мл) містить: Активні діючі речовини: -інактивованій парвовірус норок, штаб Е-mink-F1 не менше $10^{4,0}$ ТКІД50* -анатоксин Clostridium botulinum типу С, штаб Stokholm не менше 0,5 rU*(1) -інактивовані Pseudomonas aeruginosa, серотипи 5, 6 і 7/8 не менше 10^8 клітин/серотип*	СіЗет Ваксінес С.А.У. (CZ VACCINES, S.A.U.)	Іспанія	Зміни «А»

			(*перед інактивацією, (1) Вміст токсинів у відносних одиницях, визначений за допомогою ELISA за внутрішнім стандартом) Допоміжні речовини: формальдегід, неоміцину сульфат, сироватка крові новонароджених телят Ад'ювант: алюміній (у формі гідроксиду) не більше 7,5 мг			
ВАКСІТЕК ГВІ+ІВХ+ІЛТ, VAXXITEK HVT+IBD+ILT – вакцина жива векторна проти хвороби Марека, інфекційної бурсальної хвороби та інфекційного ларинготрахеїту птиці	Суспензія	Кури	Кожна доза вакцини містить по закінченню терміну придатності:Активні речовини:- живий рекомбінантний векторний вірус хвороби Марека, бурсальної хвороби та інфекційного ларинготрахеїту, серотип 3 штаб «vHVT317»...щонайменше 5640 ФУО;Допоміжні речовини:- ДМСО/ розчин для заморожування...7,5%;- середовище для заморожування додається до утворення 1 дози. Містить стрептоміцину сульфат і пеніцилін в якості бактеріостатичних агентів та амфотерицин В в якості фунгістатичного агенту; сироватку крові великої рогатої худоби у якості стабілізатора	Берінгер Інгельхайм Ветмедіка ГмбХ	Німеччина	Зміни «Б»
ЦиркоМакс – бівалентна інактивована вакцина для профілактики цирковірусної інфекції типу 2 у свиней	Емульсія	Свині	Кожна доза (2 мл) містить: Активні (діючі) компоненти: Інактивована рекомбінантна химера цирковірусу свиней тип 1, який містить цирковірус свиней тип 2a відкриту рамку зчитування 2 (ORF2) білок - 1,5-4,9 RP* Інактивована рекомбінантна химера цирковірусу свиней тип 1, який містить цирковірус свиней тип 2b відкриту рамку зчитування 2 (ORF2) білок - 1.5-5.9 RP* * RP (relative potency) — оцінки відносної активності, визначені за допомогою кількісного визначення антигену методом ELISA (тест на активність in vitro) порівняно з референтною вакциною. Ад'ювант: Метастім: сквалан, Полосамер 401, Полісорбат 80 Додаткові речовини:	Зоетіс Інк.	США	Зміни «Б»

			калій фосфат однозаміщений безводний, хлоридний натрій, хлорид калію, динатрію фосфат безводний, двозаміщений гептагідрат фосфату натрію, тетраборат динатрію декагідрат, тетранітрат, ЕДТА, вода для ін'єкцій			
ТАбік IBVAR206, TABic IBVAR206 – вакцина жива проти інфекційного бронхіту із штаму 06	Таблетка	Кури	Активнодіюча речовина: вірус інфекційного бронхіту птиці, штам 06 – $10^{3,2}$ - $10^{4,4}$ ЕІД ₅₀ /дозу. Допоміжні речовини: трехалоза – 0,08 мг/мл гідрокарбонат натрію – 0,36-0,45 г/таб. безводна лимонна кислота – 0,25-0,31 г/таб. стеарат магнію – $2,05 \times 10^{-3}$ г/таб.	АБІК Біолоджикал Лабораторіз Лтд.	Ізраїль	Зміни «Б»