

Листівка-вкладка

Назва ветеринарного препарату

Діфтосек, Diftosec – вакцина жива ліофілізована проти віспи птиці.

Склад

Одна доза (0,01 мл) ліофілізованої вакцини містить:

Активної речовини:

Атенуйований вірус віспи птиці, штам DCEP25..... не менше $10^{3.0}$ ККІД₅₀;
наповнювач.....додають до утворення 1 дози.

Одна доза розчинника містить:

Гліцерин.....1 мг;
Фізіологічний розчиндодають до утворення 1 дози.

Фармацевтична форма

Ліофілізат та розчинник.

Імунобіологічні властивості

Вакцина стимулює розвиток активного імунітету проти віспи птиці.

Період виникнення імунітету: 21 доба після вакцинації.

Тривалість імунітету: протягом 1 року.

Вид тварин

Кури (бройлери, майбутні кури-несучки та молодняк племінної птиці) та індики.

Показання до застосування

Вакцина призначена для активної імунізації курей та індиків проти віспи птиці.

Протипоказання

Не вакцинувати птицю віком до 4 тижнів.

Застереження при застосуванні

Вакцинують виключно клінічно здорову птицю.

Під час вакцинації птиці необхідно дотримуватися правил асептики.

Під час вакцинації використовувати стерильне обладнання, що не містить дезінфектантів та антисептичних засобів.

Взаємодія з іншими засобами

Не виявлено.

Особливі вказівки під час несучості

Безпечність ветеринарного імунобіологічного препарату під час несучості не встановлено. **Спосіб застосування та дози**

Після розчинення ліофілізату у гліцериновому розчиннику, добре струсити та ввести птиці шляхом проколювання перетинки крила або скарифікації шкіри на зовнішній стороні стегна.

Вакцину вводять у дозі 0,01 мл незалежно від ваги птиці відповідно до наступної схеми вакцинації.

Благополучна епізоотична ситуація:

Перша вакцинація проводиться починаючи з 4-х тижневого віку, потім щорічно бустерна вакцинація птиці, що утримується довше, ніж 18 тижнів.

Неблагополучна епізоотична ситуація:

Перша вакцинація проводиться починаючи з 4-х тижневого віку, ревакцинацію проводять однократно через 10-12 тижнів. Потім щорічні бустерні вакцинації.

Побічні ефекти

Не виявлено.

Період виведення (каренції)

0 діб.

Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу, які застосовують ВП

У разі випадкової ін'єкції людині, при необхідності, терміново звернутись за медичною допомогою.

Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним ВП, способи його знешкодження і утилізації

Знищити флакон та залишки вакцини відповідно до вимог місцевого законодавства.

Термін придатності:

24 місяці.

Термін придатності після першого відкриття: використати відразу.

Термін придатності після розчинення: використати відразу.

Умови зберігання і транспортування

Зберігати та транспортувати за температури від 2 °С до 8 °С у місці, захищеному від світла.

Упаковка

Природа первинного упакування вакцини:

Скляний флакон 1000 доз ліофілізована вакцина.

Скляний флакон 1000 доз (10 мл) розчинник.

Пластикова упаковка містить по 5 скляних флаконів ліофілізованої вакцини і по 5 скляних флаконів розчинника.

Пластикова упаковка містить по 10 скляних флаконів ліофілізованої вакцини і по 10 скляних флаконів розчинника.

Назва та місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення

Берінгер Інгельхайм Ветмедіка ГмбХ, 55216 м. Інгельхайм-на-Рейні, Німеччина.

Назва та місцезнаходження виробника

Берінгер Інгельхайм Енімал Хелс Франс СКС, Лабораторія Порте дес Алпес, руе де л'Авіеший – 69800 Сейнт Прієст, Франція.

Правила відпуску

За рецептом.

Додаткова інформація

Якщо препарат не відповідає вимогам листівки-вкладки або виникли ускладнення, застосування цієї серії негайно припиняють і повідомляють Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (ДНДІЛДВСЕ) та постачальника (виробника). Одночасно з посланцем у ДНДІЛДВСЕ направляють, відповідно до “Вказівки про порядок пред’явлення рекламцій на біологічні препарати, що призначені для застосування у ветеринарній медицині” від 03.06.98 № 2 три нерозкриті флакони цієї серії препарату за адресою: 03151, м. Київ, вул. Донецька, 30, ДНДІЛДВСЕ.