

Листівка-вкладка

Назва ветеринарного препарату

Вакцина векторна проти вірусу ентериту норок, із штаму MEV VP2, інактивована.

Якісний і кількісний склад

Кожна доза (1 мл) містить:

Діюча речовина:

Рекомбінантний VP2 білок вірусу ентериту норок, отриманий шляхом експресії химерного бакуловірусу штаму MEV-VP2 активність антигену у реакції гемаглютинації до інактивації 1:1024 - 1:8192.

Допоміжні речовини:

Ад'ювант:

Алюмінію гідроксид ≤ 10 мг;

Консервант:

Тіомеросал. $\leq 0,01$ мг

Фармацевтична форма

Суспензія.

Імунобіологічні властивості

Препарат у норок протягом 14 діб стимулює формування специфічного імунітету і захищає щеплених тварин від захворювання не менше 6 місяців. Терапевтичних властивостей не має.

Клінічні особливості

Вид тварин

Норки.

Показання до застосування

Для активної імунізації клінічно здорових норок проти парвовірусної інфекції норок з 49 денного віку.

Протипоказання

Препарат може бути застосований тільки для імунізації клінічно здорових тварин. Належна захисна імунна відповідь може бути не отримана у тварин які: знаходяться у інкубаційному періоді інфекційних захворювань, виснажених або уражених гельмінтами, які перебувають у стресовому стані, викликаному транспортуванням або впливом зовнішнього середовища, або у іншому імуносупресивному стані, або у випадках, коли вакцина була застосована не відповідно до листівки-вкладки.

Побічна дія

Після вакцинації у незначній кількості норок можуть виникати алергічні реакції.

Особливості застереження при використанні

Застосовуючи вакцину потрібно використовувати стерильні шприці та голки.

Застосування під час вагітності, лактації, несучості

Не рекомендується вакцинувати в період вагітності.

Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії

Може використовуватися в поєднанні з вакциною проти чуми м'ясоїдних.

Дози і способи введення

Підшкірно в області стегна по 1,0 мл/на тварину.

Повторюють вакцинацію через 6 місяців.

Передозування (симптоми, невідкладні заходи, антидоти)

Застосування трьох доз вакцини, не має негативного впливу на здорову норку.

При виникненні симптомів, як блювота, тремор та діарея. Невідкладні заходи при алергічних реакціях у норок під час імунізації. Екстрені заходи при алергічних реакціях у норок - своєчасне введення епінефрину або дексаметазону.

Спеціальні застереження

Необхідно дотримуватись правил асептики, особистої гігієни та техніки безпеки при проведенні вакцинації.

Період виведення (каренції)

Нуль діб.

Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу, котрі вводять засоби захисту тваринам

У разі випадкового введення людині необхідно негайно звернутись до лікаря.

Фармацевтичні особливості

Основні форми несумісності

Відсутні дані щодо безпеки та ефективності цієї вакцини при використанні у поєднанні з будь-яким іншим ветеринарним лікарським засобом.

Рішення про використання цієї вакцини до або після будь-якого іншого ветеринарного лікарського засобу повинно прийматися у кожному конкретному випадку лікарем ветеринарної медицини.

Термін придатності

18 місяців. Після відкриття вакцину використати впродовж 2-х годин.

Особливі застереження щодо зберігання

В сухому темному, не доступному для дітей місці при температурі від 2 до 8° С. Не заморожувати.

Природа і склад контейнера первинного упакування

Пластикові флакони по 90 мл/доз, та 250 мл/доз.

Назва, місцезнаходження і місце здійснення діяльності власника реєстраційного посвідчення

Квілу Анімал Хелс Продакт Ко.Лтд,

№ 10688, Венлианг роад, Донжия таун, Район Лішенг, Джинан, Провінція Шандонг, КНР.

№. 849, Донжия таун, Район Лішенг, Джинан, Провінція Шандонг, КНР.

Назва, місцезнаходження і місце здійснення діяльності виробника

Квілу Анімал Хелс Продакт Ко.Лтд,

Напівпродукт: №. 849, Донжия таун, Район Лішенг, Джинан, Провінція Шандонг, КНР.

Кінцевий продукт: №. 849, Донжия таун, Район Лішенг, Джинан, Провінція Шандонг, КНР.

Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним засобом

Використані флакони з вакциною, обладнання та невикористану вакцину слід кип'ятити не менше 20 хвилин або замочити у відповідному дезінфікуючому засобі не менше ніж на 30 хвилин.

Правила відпуску

Без рецепта.

Додаткова інформація

Якщо препарат не відповідає вимогам листівки-вкладки або виникли ускладнення, застосування цієї серії негайно припиняють і повідомляють Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (ДНДІЛДВСЕ) та постачальника (виробника). Одночасно з посланцем у ДНДІЛДВСЕ направляють, відповідно до "Вказівки про порядок пред'явлення рекламаций на біологічні препарати, що призначені для застосування у ветеринарній медицині" від 03.06.98 № 2 три нерозкриті флакони цієї серії препарату за адресою: 03151, м. Київ, вул. Донецька, 30, ДНДІЛДВСЕ.