

Листівка-вкладка

Назва ветеринарного препарату

Пулвак ІВ Праймер, Poulvac IB Primer – вакцина жива ліофілізована проти інфекційного бронхіту птиці.

Склад

Кожна доза містить:

Активні (діючі) речовини:

живий вірус інфекційного бронхіту, штам Н120 $10^{3,0} - 10^{5,4}$ EID₅₀;

живий вірус інфекційного бронхіту, штам D 274 клон $10^{3,0} - 10^{5,4}$ EID₅₀.

Допоміжні речовини:

d-маннітол 10,0 – 50,0 мкг*

желатин 36,6 – 68,0 мкг*

інозитол 10,0 – 50,0 мкг*

пептон з казеїну 13,0 – 65,0 мкг*

*кількість може змінюватись в залежності від кількості доз у флаконі.

Фармацевтична форма

Ліофілізат.

Імунобіологічні властивості

Після застосування вакцини через 10-14 діб формується активний імунітет проти інфекційного бронхіту птиці, який триває протягом не менше 3-4 місяців.

Вид тварин

Кури.

Показання до застосування

Вакцинація проти інфекційного бронхіту птиці.

Протипоказання

Не застосовувати клінічно хворим курчатам та птиці в період продуктивності.

Застереження при застосуванні

Вакцину необхідно застосовувати тільки клінічно здоровій птиці.

При застосуванні у вигляді спрею необхідно використовувати обладнання з діаметром крапель 0,12-0,15 мм. Відстань від головки розпилювача до птиці повинна бути приблизно 50 см.

При застосуванні з питною водою птицю слід тримати без води протягом приблизно 2-х годин перед вакцинацією.

Взаємодія з іншими засобами

Взаємодія з іншими вакцинами, що звичайно застосовуються протягом перших 6 тижнів життя, не спостерігалась.

Особливі вказівки при застосуванні в період продуктивності

Не використовувати у птиці в період продуктивності.

Спосіб застосування та дози

Одна доза на одну птицю при застосуванні методом випоювання або спрей-методу.

Вакцину застосовують клінічно здоровим курчатам з добового віку.

Метод випоювання:

При розчиненні вакцини спочатку розчиняють вміст флакону у 1000 см³ чистої прохолодної води, а потім додають концентрат у розраховану кількість води. Необхідна кількість вакцини розраховується в залежності від віку птиці: на 1000 курчат використовується стільки літрів, скільки днів птиці, але не більше 40 л.

Птицю слід тримати без води протягом приблизно 2-х годин перед вакцинацією. За 24 години перед проведенням вакцинації виключається застосування будь-яких інших лікарських засобів з питною водою. Не рекомендовано використання води з високим вмістом хлору.

Якщо використовується вода, що містить хлор, необхідно додавати у воду сухе знежирене молоко (2 г/л води) або знежирене молоко (1 л/50 л води).

Для подачі води необхідно використовувати тільки чисте та вільне від іржі обладнання.

Слід уникати попадання сонячних променів на розчинену вакцину.

Метод спрею:

Вакцину розчиняють таким самим способом, як і при застосуванні методу випоювання. Використовують 0,15-0,5л на 1000 курчат в залежності від аерозольного обладнання та утримання птиці. Необхідно використовувати обладнання з діаметром крапель 0,12-0,15 мм. Відстань від головки розпилювача до птиці повинна бути приблизно 50 см.

Побічні ефекти

У деяких випадках може спостерігатися незначна загальна реакція на вакцинацію у формі короточасних, легких респіраторних симптомів, таких як чхання або кашель.

Період виведення (каренції)

Нуль днів.

Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу, котрі застосовують ВП

Якщо вакцина застосовується методом спрею, слід захистити очі спеціальними захисними окулярами, а ніс і рот протипиловою маскою. Замість окулярів та маски можна використовувати захисний головний убір з циркуляцією фільтрованого повітря.

Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним ВП, способи його знешкодження і утилізації

Залишки невикористаного препарату та флакони знешкоджують відповідно до законодавства України.

Термін придатності

24 місяці.

Умови зберігання і транспортування

В оригінальній, невідкритій упаковці в темному приміщенні за температури 2° - 8°С.

Тримати подалі від тепла та уникати потрапляння прямих сонячних променів.

Упаковка

Скляні флакони по 1000, 2500 та 5000 доз, герметично закриті гумовою пробкою та алюмінієвою кришкою. Вторинне пакування: пластикові коробки, що містять 10 флаконів по 1000, 2500 та 5000 доз.

Правила відпуску

Без рецепту.

Назва та місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення

Зоетіс Інк., 10 Сільван Вей, Парсіппані, Нью Джерсі, 07054, США.

Назва та місцезнаходження виробника

Зоетіс Менюфекчурінг енд Рісерч Спеін, еС.еЛ., 17813 Валь де Біанья (Жирона), Іспанія.

Зоетіс Інк., 2000 Рокфорд Роад, Чарльз Сіті, Айова 50616, США.

Додаткова інформація

Якщо препарат не відповідає вимогам листівки-вкладки або виникли ускладнення, застосування цієї серії негайно припиняють і повідомляють Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (ДНДІЛДВСЕ) та постачальника (виробника). Одночасно з посланцем у ДНДІЛДВСЕ направляють, відповідно до "Вказівки про порядок пред'явлення рекламаций на біологічні препарати, що призначені для застосування у ветеринарній медицині" від 03.06.98 № 2 три нерозкриті флакони цієї серії препарату за адресою: 03151, м. Київ, вул. Донецька, 30, ДНДІЛДВСЕ.