

Листівка-вкладка

Назва ветеринарного препарату

VAXXON® AE - вакцина жива ліофілізована проти енцефаломієліту птиці.

Склад

Кожна доза вакцини (0,5 мл) містить:

живий атенуований вірус енцефаломієліту птиці, штам Calnek 1143: щонайменше 10^3 EID₅₀;

Допоміжні речовини: декстран 70, сахароза, сорбітом, гідролізат казеїну, КОН, КН₂РО₄, К₂НРО₄, гідролізат желатину.

Фармацевтична форма

Вакцина: ліофілізат.

Імунобіологічні властивості

Для активної імунізації курей віком від 10 тижнів проти енцефаломієліту птиці з метою запобігання смертності, та клінічним проявам захворювання. Імунний захист починається приблизно через 4 тижні після вакцинації і триває щонайменше 30 тижнів.

АТС вет код: QI01AD02.

Вид тварин

Кури.

Показання до застосування

Для вакцинації птиці проти енцефаломієліту.

Протипоказання

Відсутні.

Застереження при застосуванні

- За 2-3 години до вакцинації призупинити подачу питної води для того, щоб птиця відчувала спрагу;
- Контролювати чистоту систем напування. Вони мають бути чисті;
- Після визначення кількості голів птиці, яких потрібно вакцинувати, необхідно підготувати чисті контейнери (без дезінфікуючих засобів) з необхідною для випоювання вакцини кількістю води.
- Вся птиця повинна мати доступ до поїлок одночасно.
- Розведення вакцини в питній воді та її застосування повинне проводитись в найкоротші терміни;
- Питна вода, що містить вакцину повинна бути випосна за 3 години;
- Не тримайте воду, що містить вакцину біля джерел тепла (лампи, і так далі) або інтенсивного світла;
- Використовувати воду, яка не містить хлору або слідів дезінфікуючих речовин;
- Порошок знежиреного молока або іншого стабілізатора може бути доданий до води.

Взаємодія з іншими засобами

Під час проведення досліджень на безпечність вакцини взаємодії з іншими лікарськими засобами не спостерігались.

Особливі вказівки під час несучості

Не слід використовувати.

Спосіб застосування та дози

Вакцинацію курей проводять методом випоювання один раз, у віці між 10-м і 15-им тижнем вирощування.

Для отримання вакцинного розчину флакон вакцини розчиняють в 1 л чистої питної води.

Групове випоювання вакцини: вакцинний розчин додають до прохолодної свіжої води із розрахунку орієнтовно 1000 доз вакцини на 1 літр води на день життя для 1000 курей. Тобто 70 літрів води було б необхідно для 1000 курей 10-тижневого віку. Зазвичай 50-70 л питної води необхідно для вакцинації 1000 голів птиці 10 тижневого віку.

У разі сумніву, визначте кількість спожитої за день води до проведення вакцинації. Застосовуйте розбавлену вакцину негайно. Слідкуйте, щоб під час вакцинації птиця не мала доступу до звичайної води.

Індивідуальна вакцинація: 1 флакон на 1000 доз розвести у 500 мл води. Застосовувати перорально по 0,5 мл на 1 птицю.

Період виведення (каренції)

0 діб.

Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу, які застосовують ВІП

Необхідно дотримуватись правил роботи з ветеринарними препаратами. Препарат повинен вводитися фахівцями, лікарем ветеринарної медицини або птахівником, які мають відповідний досвід поводження із цим ветеринарним препаратом.

Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним ВІП, способи його знешкодження і утилізації

Флакони після використання повинні бути занурені в антисептичний розчин.

Термін придатності

Продукт в оригінальній упаковці може бути використаний протягом 24 місяців від дати виготовлення.

Умови зберігання і транспортування

Зберігати в сухому, темному місці при температурі від 2 до 8 °С.

Не заморожувати.

Розведена у воді вакцина повинна бути використана протягом 3 годин.

Упаковка

Скляні флакони типу І по 7 мл закупорені корком та обкатані алюмінієвим та поліпропіленовим ковпачком, що містять ліофілізовану вакцину (1000, 2500, 5000, 10000 доз).

Назва та місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення

ІЗО С.р.л.а соціо уніко, Італія, 25124 Брешиа, в'яз Сан Зено, 99/А.

Назва та місцезнаходження виробника:

ІЗО С.р.л.а соціо уніко, Італія, 27013 Кін'йоло По (ПВ), С.С. 234 км 28,200 .

Правила відпуску

Без рецепта.

Додаткова інформація

Якщо препарат не відповідає вимогам листівки-вкладки або виникли ускладнення, застосування цієї серії негайно припиняють і повідомляють Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (ДНДІЛДВСЕ) та постачальника (виробника). Одночасно з посланцем у ДНДІЛДВСЕ направляють, відповідно до «Вказівки про порядок пред'явлення реклаमाцій на біологічні препарати, що призначені для застосування у ветеринарній медицині» від 03.06.98 №2 три нерозкриті флакони цієї серії препарату за адресою: 03151, м. Київ, вул. Донецька, 30, ДНДІЛДВСЕ.