

Листівка-вкладка

Назва ветеринарного препарату

VAXXON® СНВ - вакцина жива ліофілізована проти ньюкаслської хвороби та інфекційного бронхіту птиці штами Массачусетс та 28/86.

Склад

Кожна доза вакцини містить:

живий атенуйований вірус ньюкаслської хвороби, штам Клон (штам Ла Сота клонований): $\geq 10^6$ ЕІД₅₀;

живий атенуйований вірус інфекційного бронхіту птиці, штам Н120, серотип Массачусетс: $\geq 10^3$ ЕІД₅₀;

живий атенуйований вірус інфекційного бронхіту птиці, штам 28/86 $\geq 10^3$ ЕІД₅₀;

стабілізаційний розчин: декстран 70, сахароза, сорбітол, гідролізат казеїну, КОН, КН₂РО₄, К₂НРО₄, гідролізат желатину.

Фармацевтична форма

Ліофілізат.

Імунобіологічні властивості

Період виникнення імунітету: 14 днів.

Тривалість імунітету: 14 тижнів.

Формує активний імунітет у курей проти ньюкаслської хвороби та респіраторних і нефропатогенних форм інфекційного бронхіту птиці.

Вид тварин

Кури.

Показання до застосування

Профілактика ньюкаслської хвороби та респіраторних і нефропатогенних форм інфекційного бронхіту птиці.

Протипоказання

Відсутні.

Застереження при застосуванні

Відсутні.

Взаємодія з іншими засобами

Рішення щодо використання цієї вакцини до або після будь-якого іншого ветеринарного засобу має бути прийняте індивідуально.

Особливі вказівки під час несучості

Не застосовувати.

Спосіб застосування та дози

Застосування інтраокулярно, методом розпилення або випоювання з питною водою.

Перше введення: 1-доба – методом випоювання або інтраокулярно (закапуванням в око або спреєм).

Друга вакцинація: через 2-3 тижні після першої вакцинації.

Для курей несучок та батьківського поголів'я рекомендована третя доза у віці 10 тижнів.

Кількість води змінюється в залежності від віку і пори року.

Розчинення вакцини

Зніміть алюмінієву кришку з флакона з вакциною та розчиніть ліофілізовану таблетку.

Питна вода:

- зніміть пробку з флакона та налейте 2–3 мл деіонізованої або питної води
- поставте пробку на місце та струсіть до повного розчинення
- додайте розчинену вакцину до необхідного для вакцинації об'єму води, який залежить від кількості доз та використовуваного обладнання.

- ввести негайно після розчинення протягом 2 годин.

Закапування очних крапель

- зняти пробку з флакона, наповнити його фізіологічним розчином, стерильною дистильованою водою або розчинником VAXXON® DILUENT та розчинити вакцину
- ввести за допомогою стандартної крапельниці

Розпилення:

- використовуйте розпилювач, що утворює краплі відповідного розміру (для одноденних пташенят — грубе розпилення; для птахів віком від трьох тижнів і старше — дрібне розпилення)
- розпилюйте на відстані приблизно 1 метра від птахів.

Кількість води або розчинника, що використовують для 1000 доз:

- очні краплі: 30 мл;
- розпилення: 250-500 мл тільки для 1000 курчат віком від одного до п'ятнадцяти діб;
- випоювання: - 20-40 л для 1000 голів курчат віком від тридцяти діб.
- 5-10 л для 1000 голів курчат віком від одного до п'ятнадцяти діб;
- 10-20 л для 1000 голів курчат віком від п'ятнадцяти до тридцяти діб;

Період виведення (каренції)

0 днів.

Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу, які застосовують ВП

Необхідно дотримуватись правил роботи з ветеринарними препаратами. Препарат вводять фахівці, лікарі ветеринарної медицини або птахівники, які мають відповідний досвід поводження із цим ветеринарним препаратом.

Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним ВП, способи його знешкодження і утилізації

Невикористаний препарат, або препарат з вичерпаним терміном придатності та порожні флакони знешкоджують відповідно до вимог законодавства України.

Термін придатності

Продукт в оригінальній упаковці може бути використаний за 24 місяці від дати виготовлення.

Умови зберігання і транспортування

Зберігати в сухому, темному місці за температури від 2 до 8 °С.

Не заморожувати.

Розведена у воді вакцина повинна бути використана за 2 години.

Упаковка

Скляні флакони типу I по 7 мл, що містять ліофілізовану вакцину (1000, 2500, 5000, 10000 доз), закупорені гумовим корком та обкатані алюмінієвим та поліпропіленовим ковпачком. Картонні коробки, що вміщують 10 флаконів по 1000, 2500, 5000, 10000 доз вакцини.

Назва та місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення

ІЗО С.р.л.а соціо уніко, Італія, 25124 Брешиа, в'яз Сан Зено, 99/А.

Назва та місцезнаходження виробника:

ІЗО С.р.л.а соціо уніко, Італія, 27013 Кін'йоло По (ПВ), С.С. 234 км 28,200 .

Правила відпуску

За рецептом.

Додаткова інформація

Якщо препарат не відповідає вимогам листівки-вкладки або виникли ускладнення, застосування цієї серії негайно припиняють і повідомляють Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (ДНДІЛДВСЕ) та постачальника (виробника). Одночасно з посланцем у ДНДІЛДВСЕ направляють, відповідно до «Вказівки про порядок пред'явлення рекламцій на біологічні препарати, що призначені для застосування у ветеринарній медицині» від 03.06.98 №2 три нерозкриті флакони цієї серії препарату за адресою: 03151, м. Київ, вул. Донецька, 30, ДНДІЛДВСЕ.