

Листівка-вкладка

Назва ветеринарного препарату

VAXXON® ND-IB3-EDS – вакцина інактивована емульгована проти ньюкаслської хвороби, інфекційного бронхіту та синдрому зниження несучості '76.

Склад

Кожна доза вакцини (0,5 мл) містить:

Активні речовини:

інактивованій вірус ньюкаслської хвороби, штам Ульстер: ≥ 50 ПД₅₀ ;
інактивованій вірус інфекційного бронхіту штам Масачусетс М41: $\geq 10^{7.5}$ EID₅₀ до інактивації;
інактивованій вірус інфекційного бронхіту штам D274: $\geq 10^{7.5}$ EID₅₀ до інактивації;
інактивованій вірус інфекційного бронхіту штам D1466: $\geq 10^{7.5}$ EID₅₀ до інактивації;
інактивованій аденовірус синдрому зниження несучості '76 virus, штам Мак Феран 127: $\geq 10^8$ EID₅₀ до інактивації;

Допоміжні речовини:

- моноолеат сорбіту, легке мінеральне масло, тіомерсал, полісорбат 80.

Фармацевтична форма

Масляна емульсія.

Імунобіологічні властивості

Формує активний імунітет у птиці проти інфекційного бронхіту, ньюкаслської хвороби та синдрому зниження несучості.

Період виникнення імунітету: 21 доба після вакцинації.

Тривалість імунітету: 35-40 тижнів.

Вид тварин

Кури.

Показання до застосування

Для профілактики захворювання курей несучок, батьківського поголів'я курей на ньюкаслську хворобу, інфекційний бронхіт і синдром зниження несучості.

Протипоказання

Не застосовувати клінічно хворій птиці.

Застереження при застосуванні

Відсутні.

Взаємодія з іншими засобами

Не встановлено.

Особливі вказівки під час несучості

Не застосовувати для племінної птиці в період несучості.

Спосіб застосування та дози

Застосовувати: підшкірно (нижня ділянка шиї) чи внутрішньом'язово (грудні м'язи, стегно) у дозі 0,5 мл одній птиці.

Вакцинувати птицю до початку періоду несучості (у віці від 14 до 18 тижнів).

Для тривалого захисту інактивовану вакцину слід застосовувати у якості бустерних вакцинацій. Первинні вакцинації проводять живими вакцинами проти ньюкаслської хвороби та інфекційного бронхіту.

Період виведення (каренції)

0 днів.

Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу, які застосовують ВІП

Випадкове введення цієї вакцини особі, яка проводить вакцинацію може призвести до серйозних місцевих реакцій, що потребує негайного медичного огляду. Необхідно проінформувати лікаря, що вакцина є масляною емульсією.

Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним ВІП, способи його знешкодження і утилізації

Невикористаний препарат, або препарат з вичерпаним терміном придатності та порожні флакони знешкоджують відповідно до вимог законодавства України.

Термін придатності

24 місяці.

Умови зберігання і транспортування

Зберігати в сухому, темному місці за температури від 2 до 8 °С.

Після першого відкриття зберігати в сухому, темному місці за температури від 2 до 8° С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Берегти від дії прямих сонячних променів. Не заморозувати.

Упаковка

Поліпропіленові флакони по 250 мл, 500 мл.

Назва та місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення

ІЗО С.р.л.а соціо уніко, Італія, 25124 Брешиа, в'яз Сан Зено, 99/А.

Назва та місцезнаходження виробника:

ІЗО С.р.л.а соціо уніко, Італія, 27013 Кін'йоло По (ПВ), С.С. 234 км 28,200.

Правила відпуску

За рецептом.

Додаткова інформація

Якщо препарат не відповідає вимогам листівки-вкладки або виникли ускладнення, застосування цієї серії негайно припиняють і повідомляють Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (ДНДІЛДВСЕ) та постачальника (виробника). Одночасно з посланцем у ДНДІЛДВСЕ направляють, відповідно до «Вказівки про порядок пред'явлення рекламаций на біологічні препарати, що призначені для застосування у ветеринарній медицині» від 03.06.98 №2 три нерозкриті флакони цієї серії препарату за адресою: 03151, м. Київ, вул. Донецька, 30, ДНДІЛДВСЕ.