

Листівка-вкладка

Назва ветеринарного препарату

VAXXON® POX - вакцина жива ліофілізована (з розчинником VAXXON® DILUENT POX) проти віспи птиці

Склад

Кожна доза вакцини (0,012 мл) містить:

живий атенуйований вірус віспи птиці, штам Р-1: щонайменше 10^3 TCID₅₀;

стерильна сироватка коней, розчин гліцину.

Розчинник: вода для ін'єкцій.

Фармацевтична форма

Вакцина: ліофілізат.

Розчинник: розчин.

Імунобіологічні властивості

Формує активний імунітет у курей проти віспи. Імунний захист починається щонайменше через 3 тижні після вакцинації і триває щонайменше 23 тижні.

Вид тварин

Кури.

Показання до застосування

Профілактика віспи птиці.

Протипоказання

Протипоказання відсутні.

Застереження при застосуванні

Через 7 днів спостерігається припухлість у вигляді вузлика, що свідчить про хорошу імунну відповідь.

Взаємодія з іншими засобами

Під час проведення досліджень на безпечність вакцини взаємодії з іншими лікарськими засобами не спостерігались.

Особливі вказівки під час несучості

Не слід використовувати.

Спосіб застосування та дози

Батьківське поголів'я: вакцинують курчат 5-15-тижневого віку.

Кури несучки: вакцинують за 1 місяць до початку періоду несучості.

Занурити в суспензію вакцини зубці аплікатора і вколоти у перетинку крила.

Період виведення (каренції)

0 діб.

Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу, які застосовують ВП

Необхідно дотримуватись правил роботи з ветеринарними препаратами. Препарат повинен вводитися фахівцями, лікарем ветеринарної медицини або птахівником, які мають відповідний досвід поводження із цим ветеринарним препаратом.

Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним ВП, способи його знешкодження і утилізації

Флакони після використання повинні бути занурені в антисептичний розчин.

Термін придатності

Вакцина в оригінальній упаковці може бути використаний протягом 24 місяців від дати виготовлення.

Умови зберігання і транспортування вакцини.

Зберігати в сухому, темному місці при температурі від 2 до 8 °C.

Не заморожувати.

Після відкриття флакону, продукт повинен бути використаний протягом 2 годин.

Продовження додатку №2
до реєстраційного посвідчення
№ ВА-00809-02-16
Від

Розчинник в оригінальній упаковці може бути використаний протягом 60 місяців від дати виготовлення.

Умови зберігання і транспортування розчинника.

Зберігати у прохолодному темному місці за кімнатної температури.

Після відкриття флакону, продукт повинен бути використаний одразу.

Упаковка

Скляні флакони типу I по 7 мл закупорені корком та обкатані алюмінієвим та поліпропіленовим ковпачком, що містять вакцину (1000 доз) у вигляді бежевих таблеток.

Поліпропіленові флакони з розчинником, 1 аплікатор.

Вторинне пакування:

-Картонна коробка, що містить 1 флакон вакцини, 1 флакон розчинника та 1 аплікатор.

-Картонні коробки по 10 флаконів + 10 пляшок з розчинником + 10 аплікаторів.

Назва та місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення

ІЗО С.р.л.а соціо уніко, Італія, 25124 Брешиа, віа Сан Зено, 99/А.

Назва та місцезнаходження виробника:

ІЗО С.р.л.а соціо уніко, Італія, 27013 Кіньюло По (ПВ), С.С. 234 км 28,200 .

Правила відпуску

За рецептом.

Додаткова інформація

Якщо препарат не відповідає вимогам листівки-вкладки або виникли ускладнення, застосування цієї серії негайно припиняють і повідомляють Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (ДНДІЛДВСЕ) та постачальника (виробника). Одночасно з посланцем у ДНДІЛДВСЕ направляють, відповідно до «Вказівки про порядок пред'явлення рекламацій на біологічні препарати, що призначені для застосування у ветеринарній медицині» від 03.06.98 №2 три нерозкриті флакони цієї серії препарату за адресою: 03151, м. Київ, вул. Донецька, 30, ДНДІЛДВСЕ.