

ЛИСТІВКА-ВКЛАДКА

Назва ветеринарного препарату

POLIMUN ND Hitchner B1, ПОЛІМУН НХ Хітчнер B1- вакцина проти ньюкаслської хвороби птиці, жива

Склад

Активні речовини в дозі:

отриманий на ВПФ курячих ембріонах вірус ньюкаслської хвороби штам Хітчнер B1 $\geq 10^{6,0}$ ЕІД₅₀.

Допоміжні речовини:

пептон або LH-B – 120 мг у флаконі, незалежно від дозування.

Фармацевтична форма

Ліофілізат.

Імунобіологічні властивості

АТС vet код: QI01AD06.

Фармакотерапевтична група: хвороба ньюкасла/параміксовірус.

Вакцина забезпечує захист щепленого поголів'я через 7-10 діб після вакцинації від захворювання на ньюкаслську хворобу птиці. Тривалість імунітету становить до 4 тижнів.

Вид тварин

Кури.

Показання до застосування

Профілактика ньюкаслської хвороби птиці.

Протипоказання

Забороняється вакцинувати птицю яка:

- знаходиться в інкубаційному періоді інфекційного захворювання;
- знаходиться у стані виснаження;
- уражена гельмінтами;
- перебуває у стресовому стані, викликаному транспортуванням, впливом зовнішнього середовища, або у іншому імуносупресивному стані.

Напруженість імунітету може бути недостатньою у випадках, коли вакцина була застосована не відповідно до листівки-вкладки.

Застереження при застосуванні

Не використовувати вакцину з флаконів з тріщинами, без етикеток, порушенням укупорювання, а також не використати впродовж двох годин з моменту її розчинення або з закінченим терміном придатності.

Взаємодія з іншими засобами

Дозволено застосовувати з вакцинами компанії «Біотестлаб» проти інфекційного бронхіту курей.

Особливі вказівки (в період несучості)

Нема протипоказань.

Спосіб застосування та дози

Вакцинують птицю в умовах інкубатора або пташниках з добового віку в благополучних по ньюкаслській хворобі господарствах одним з наступних методів: спрей-методом, інтраокулярно або методом випоювання.

Пам'ятка перед проведенням вакцинації:

Використовувати чисте обладнання в справному стані, що не містить залишків дезінфектантів.

Температура води має становити 10-20 °С.

Вода для розчинення вакцини не повинна містити іонів хлору та заліза, а також антибіотиків та дезінфектантів.

Для більш якісного проведення вакцинації рекомендується використовувати індикатор-стабілізатор «ІНДИГО» або інші аналогічні за якістю.

Вакцину розчиняють шляхом додавання 5-8 мл охолодженої чистої питної або кип'яченої води у флакон з вакциною та ретельним струшуванням до повного розчинення ліофілізату.

Отриманий розчин використовують для приготування робочих розчинів для застосування препарату методами спрею та випоювання.

Спрей-метод

Для розпилення вакцини використовують автоматичний розпилювач або розпилювач з ручним керуванням. При використанні розпилювача з ручним керуванням важливо нанести вакцину на птахів двічі.

Відкалібрувати автоматичний розпилювач (або розпилювач з ручним керуванням) для розпилення крапель відповідного розміру. Перед проведенням вакцинації перевірити відповідність розміру крапель і рівномірність нанесення розчину шляхом розпилення його на будь яку контрастну поверхню.

Кількість доз препарату обирають в залежності від кількості птиці, що підлягає вакцинації. Налити розчин вакцини в резервуар розпилювача і обережно розмішати.

Розчин з вакциною поповнюють кожні 1,5-2 години. Необхідно слідкувати за роботою випускного отвору та температурою води (10-20°C). Розпилення проводять з висоти близько 40 см над головами птахів. У результаті розпилення птиця повинна бути повністю змоченою.

Проведення вакцинації крупнокрапельним методом:

Вакцинують курчат з добового віку. На кожні 1000 доз потрібно 200-300 мл води. Розмір крапель 150-250 мікрон. Після розпилення утримують птахів 15-20 хвилин в закритому, добре прогрітому приміщенні подалі від протягів до повного висихання.

Увімкнути вентиляцію, обігрів та освітлення через 15-20 хвилин після вакцинації.

Інтраназальний/інтраокулярний метод:

1000 доз вакцини необхідно розчинити в 100 мл фізіологічного розчину і закапати курчатам стандартною піпеткою на слизову оболонку носа або кон'юнктиву ока по дві краплі (2x0,05 мл).

Метод випоювання:

За добу до застосування вакцини проводять визначення об'єму води в літрах, що випиває птиця продовж 1-1,5 години. Вакцинацію бажано проводити зранку. В залежності від вологості та температури повітря перебивають подачу води до вакцинації для бройлерів за 0,5-3 години та за 1-4 години птиці яєчних порід.

Вміст флаконів з вакциною розчиняють в питній воді таким чином, щоб в визначеному попередньо об'ємі води для випоювання містилась одна доза вакцини для однієї птиці.

Поїлки перед вакцинацією повинні бути ретельно вимиті без додавання дезінфікуючих розчинів.

В разі загрози заносу в господарство збудника ньюкаслської хвороби, курчат, що провакциновані у віці 1-7 діб, ревакцинують одним з наведених методів через 2-3 тижні вакциною «ПОЛІМУН НХ Хітчнер В1 вакцина проти ньюкаслської хвороби птиці, жива» або «ПОЛІМУН НХ КЛОН 124 вакцина проти ньюкаслської хвороби птиці, жива» або «ПОЛІМУН ЛА СОТА вакцина проти ньюкаслської хвороби птиці, жива»

Побічні ефекти

При застосуванні спрею методу у деякої птиці можливі короточасні респіраторні явища у першу добу після вакцинації.

Період виведення (каренції)

Нуль діб.

Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу, які застосовують ВІП (ветеринарний імунобіологічний препарат)

Необхідно дотримуватись правил асептики, особистої гігієни та роботи з птицею.

Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним ВІП, способи його знешкодження і утилізації

Не використану вакцину впродовж 2 годин після розчинення або вакцину із закінченим терміном придатності необхідно знезаразити кип'ятінням впродовж 30 хвилин.

Термін придатності

18 місяців. Після розчинення вакцину використовують впродовж 2-х годин.

Умови зберігання і транспортування

В темному, недоступному для дітей місці, при температурі від 2 до 8°C або мінус 20°C.

Упаковка та фасування

Скляні флакони по 100, 300, 500, 1000, 2000, 2500 або 5000 доз закриті гумовими пробками та закатані алюмінієвими ковпачками.

Назва та місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення

ТОВ „БІОТЕСТЛАБ” 08601 Київська обл., м. Васильків, вул. Володимирська 57-А.

Адреса виробництва: 08601 Київська обл., м. Васильків, вул. Лістового Олександра, буд. 1/3

Правила відпуску

За рецептом

Додаткова інформація

Якщо препарат не відповідає вимогам листівки-вкладки або виникли ускладнення, застосування цієї серії негайно припиняють і повідомляють Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (ДНДІЛДВСЕ) та постачальника (виробника). Одночасно з посланцем у ДНДІЛДВСЕ направляють, відповідно до «Вказівки про порядок пред'явлення рекламаций на біологічні препарати, що призначені для застосування у ветеринарній медицині» від 03.06.98 №2 три нерозкриті флакони цієї серії препарату за адресою: 03151, м. Київ, вул. Донецька, 30, ДНДІЛДВСЕ.