

ЛИСТІВКА-ВКЛАДКА

Назва ветеринарного препарату

POLIMUN ND Hitchner B1+ IB N120, ПОЛІМУН НХ Хітчнер B1+ІБК Н120 - вакцина проти Ньюкаслської хвороби та інфекційного бронхіту курей, жива

Склад

Доза вакцини містить отримані на ВПФ курячих ембріонах віруси:

Ньюкаслської хвороби птиці штаму Хітчнер B1 $\geq 10^{6,0}$ ЕІД₅₀;

інфекційного бронхіту курей штаму Н-120 $\geq 10^{3,5}$ ЕІД₅₀.

Фармацевтична форма

Ліофілізат.

Імунобіологічні властивості

АТС vet код: QI01AD11.

Фармакотерапевтична група: newcastle disease virus + avian infectious bronchitis virus

Застосування вакцини забезпечує формування специфічного імунітету проти Ньюкаслської хвороби та інфекційного бронхіту курей. Тривалість імунітету становить до 4 тижнів.

Терапевтична дія відсутня.

Вид тварин

Кури.

Показання до застосування

Профілактика ньюкаслської хвороби та інфекційного бронхіту курей.

Протипоказання

Забороняється вакцинувати птицю яка:

- знаходиться в інкубаційному періоді інфекційного захворювання;
- знаходиться у стані виснаження;
- уражена гельмінтами;
- перебуває у стресовому стані, викликаному транспортуванням, впливом зовнішнього середовища, або у іншому імуносупресивному стані.

Напруженість імунітету може бути недостатньою у випадках, коли вакцина була застосована не відповідно до листівки-вкладки.

Застереження при застосуванні

Не використовувати вакцину з флаконів зі тріщинами, без етикеток, порушенням укупорювання, зі зміною кольору, не використати впродовж двох годин з моменту її розчинення або з закінченим терміном придатності.

Взаємодія з іншими засобами.

Вода для розчинення вакцини не повинна містити іони хлору та заліза, а також антибіотики та

дезінфектанти.

Особливі вказівки (в період несучості) Застосування вакцини не впливає на несучість, запліднення та інкубацію яєць.

Спосіб застосування та дози

Вакцинують птицю в умовах інкубатора або пташниках з добового віку в благополучних по Ньюкаслській хворобі та інфекційному бронхіту курей господарствах з проведенням подальшої ревакцинації у 14-21-денному віці одним з наступних методів: спрей-методом, інтраназально/інтраокулярно або методом випоювання.

Пам'ятка перед проведенням вакцинації:

Використовувати чисте обладнання в справному стані, що не містить залишків дезінфектантів.

Температура води має становити 10-20 °С.

Вода для розчинення вакцини не повинна містити іонів хлору та заліза, а також антибіотиків та дезінфектантів.

Для більш якісного проведення вакцинації рекомендується на один літр води додавати 2 г сухого знежиреного молока або використовувати індикатор-барвник «ІНДИГО» чи інші аналогічні за якістю.

Вакцину розчиняють шляхом додавання 5-8 мл охолодженої чистої питної або кип'яченої води у флакон з вакциною та ретельним струшуванням до повного розчинення ліофілізату.

Отриманий розчин використовують для приготування робочих розчинів для застосування препарату методами спрею та випоювання.

Проведення вакцинації крупнокрапельним методом:

В приміщенні пташника з курчатами зменшують освітлення до мінімуму, вентиляцію виключають.

Вакцинують курчат з добового віку. На кожні 1000 доз потрібно 200-300 мл води. Розмір крапель 150-250 мікрон. Після розпилення утримують птахів 15-20 хвилин в закритому, добре прогрітому приміщенні подалі від протягів до повного висихання.

Увімкнути вентиляцію, обігрів та освітлення через 15-20 хвилин після вакцинації.

Метод випоювання:

За добу до застосування вакцини проводять визначення об'єму води в літрах, що випиває птиця продовж 1-1,5 години. Вакцинацію бажано проводити зранку. В залежності від вологості та температури повітря перекривають подачу води до вакцинації для бройлерів за 0,5-3 години та за 1-4 години птиці яєчних порід.

Вміст флаконів з вакциною розчиняють в питній воді таким чином, щоб в визначеному попередньо об'ємі води для випоювання містилась одна доза вакцини для однієї птиці.

Поїлки перед вакцинацією повинні бути ретельно вимиті без додавання дезінфікуючих розчинів.

Інтраназальний/інтраокулярний метод:

1000 доз вакцини необхідно розчинити в 100 мл офіціального фізіологічного розчину і закапати курчатам стандартною піпеткою на слизову оболонку носа або кон'юктиву ока по дві краплі (2x0,05 мл).

В разі загрози заносу в господарство збудника ньюкаслської хвороби або інфекційного бронхіту, курчат, що вакциновані у віці 1-7 діб, ревакцинують через 2-3 тижні одним з наведених методів.

Побічні ефекти

Можлива незначна реакція у де яких курчат у формі слабких респіраторних симптомів при вакцинації методом крупно-крапельного спрею, що зникають впродовж 3-5 днів.

Період виведення (каренції)

Нуль діб.

Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу, які застосовують ВІП (ветеринарний імунобіологічний препарат)

Необхідно дотримуватись правил асептики, особистої гігієни та техніки безпеки при проведенні вакцинації.

Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним ВІП, способи його знешкодження і утилізації

Не використану вакцину впродовж 2 годин після розчинення або вакцину із закінченим терміном придатності необхідно знезаразити кип'ятінням впродовж 30 хвилин.

Термін придатності

18 місяців. Після розчинення вакцину використати впродовж 2-х годин.

Умови зберігання і транспортування

В темному, недоступному для дітей місці, при температурі від 2 до 8°C або мінус 20°C.

Упаковка та фасування

Скляні флакони по 100, 300, 500, 1000, 2000, 2500 або 5000 доз закриті гумовими пробками та закатані алюмінієвими ковпачками.

Назва та місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення

ТОВ „БІОТЕСТЛАБ” 08601 Київська обл., м. Васильків, вул. Володимирська 57-А.

Адреса виробництва: 08601 Київська обл., м. Васильків, вул. Лістрового Олександра, буд. 1/3

Правила відпуску

За рецептом.

Додаткова інформація

Якщо препарат не відповідає вимогам листівки-вкладки або виникли ускладнення, застосування цієї серії негайно припиняють і повідомляють Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (ДНДІЛДВСЕ) та постачальника (виробника). Одночасно з посланцем у ДНДІЛДВСЕ направляють, відповідно до «Вказівки про порядок пред'явлення рекламаций на біологічні препарати, що призначені для застосування у ветеринарній медицині» від 03.06.98 №2 три нерозкриті флакони цієї серії препарату за адресою: 03151, м. Київ, вул. Донецька, 30, ДНДІЛДВСЕ.