

Листівка-вкладка

Назва ветеринарного препарату

Імунобактерин-D пробіотик.

Склад

1 г містить:

Кількість життєздатних клітин бактерій роду <i>Bacillus</i> (<i>B.subtilis</i> , <i>B.licheniformis</i> , <i>B.amyloliquefaciens</i> , <i>B.megaterium</i> , <i>B.pumilus</i> , <i>B.coagulans</i> , <i>B.mucilaginosus</i>), не менше КУО	1×10^{10}
Кількість життєздатних клітин молочнокислих бактерій (<i>Enterococcus faecium</i> , <i>Lactobacillus acidophilus</i>), не менше КУО	$3,5 \times 10^7$
Ксиланаза	700 од/г
Протеаза	6 од/г
Амілаза	20 од/г
Ліпаза	300 од/г
Наповнювач декстроза або цукроза	до 1 г

Фармацевтична форма

Порошок (водорозчинний).

Імунобіологічні властивості

Нормалізує мікрофлору кишечника шляхом колонізації кишкового епітелію, проявляє антагоністичну дію до патогенних та умовно-патогенних мікроорганізмів. За рахунок зменшення патогенної флори у кишечнику, спостерігається збільшення ендогенних лактобактерій. Бактерії, які входять до складу пробіотика зміцнюють імунітет, підвищують збереженість поголів'я.

Ферменти, які входять до складу, розріджують хімус, чим сприяють дію пробіотика. Пробиотичні бактерії роду *Bacillus*, *Enterococcus*, *Lactobacillus* пригнічують ріст деяких умовнопатогенних мікроорганізмів, забезпечують часткове руйнування мікотоксинів, сприяють відновленню мікрофлори кишечника профілактують та припиняють проноси, викликані патогенними бактеріями.

За рахунок синергічної дії всіх компонентів пробіотика на корм тварин та птиці створюються сприятливі умови для травлення, поліпшується конверсія корму, зменшується вплив токсинів на організм тварин, підвищується продуктивність та збереженість поголів'я. Таким чином при використанні пробіотика можна виключити використання антибіотиків.

Вид тварин

Птиця м'ясних порід, кури-несучки, індики, свинюматки, поросята, свині на відгодівлі, телята, корови, кози, кролі, хутрові звірі, риба, собаки, коти, птахи декоративні, бджоли.

Показання до застосування

Для нормалізації мікрофлори кишечника, підвищення збереженості поголів'я тварин та птиці, для зміцнення імунітету, збільшення продуктивності бджіл.

Протипоказання

Відсутні.

Застереження при застосуванні

Немає.

Взаємодія з іншими засобами

Пробиотичні бактерії *Bacillus spp*, які входять до складу пробіотика є малочутливими до таких антибіотиків як колістин сульфату, гентаміцин, амоксицилін, неоміцин, стрептоміцин. Пробиотик не застосовувати з такими антибіотиками: тилозином, пеніциліном, енрофлосацином, доксицикліном та препаратом триметопримом у комбінації з сульфадіазином, так як до них чутливі пробиотичні бактерії *Bacillus spp*.

Особливі вказівки при вагітності, лактації, несучості

Пробіотик може застосовуватись при вагітності, лактації, несучості.

Спосіб застосування та дози

Змішують з кормом, преміксами, БВД, БМВД, чи водою з розрахунку:

Птиця

Птиця м'ясних порід віком до 15 днів	0,1 – 0,2 кг на тонну комбікорму 0,05 – 0,1 кг на тонну води
Птиця м'ясних порід віком від 15 днів і до забою	0,1 – 0,2 кг на тонну комбікорму 0,05 – 0,1 кг на тонну води
Кури-несучки	0,1 – 0,2 кг на тонну комбікорму 0,05 – 0,1 кг на тонну води
Індики	0,1 – 0,2 кг на тонну комбікорму 0,05 – 0,1 кг на тонну води

Свині

Свиноматки	0,1 – 0,2 кг на тонну комбікорму 0,05 – 0,1 кг на тонну води
Поросята	0,1 – 0,2 кг на тонну комбікорму 0,05 – 0,1 кг на тонну води
Свині на відгодівлі	0,1 – 0,2 кг на тонну комбікорму 0,05 – 0,1 кг на тонну води

ВРХ

Телята	1,0 – 2,0 г на 10 кг ваги теляти в день з молоком або з ЗЦМ
Корови	0,05 – 0,1 кг на тонну води 1,0 – 0,2 кг на тонну концентрованого корму

ДРХ

Кози	0,5 – 1,0 г тварині в день з молоком або з ЗЦМ
Хутрові звірі	
Норки та інші хутрові	0,1 – 0,2 кг на тонну комбікорму 0,05 – 0,1 кг на тонну води

Риба

Риба	0,1 – 0,2 кг на тонну комбікорму
------	----------------------------------

Тварини декоративні

Собаки, коти	вага до 10 кг – 1,0 г на тварину на добу вага до 20 кг – 2,0 г на тварину на добу вага до 30 кг – 3,0 г на тварину на добу вага до 40 кг – 4,0 г на тварину на добу
--------------	--

Птахи декоративні

Птахи декоративні, папуги	0,1 – 0,2 г на кілограм корму 0,05 – 0,1 г на один літр води
---------------------------	---

Бджоли

Бджоли	2,5 г на бджолосім'ю попередньо розведений у 5 мл питної води шляхом додавання у 150-200 г сиропу для підгодівлі впродовж п'яти днів, обробку можливо проводити раз на місяць впродовж медоносного періоду
--------	--

У разі застосування пробіотика методом випоювання з водою протрібно провести підготовку для активації бактерій. Розраховану дозу пробіотика 0,05 – 0,1 кг (на 1 тону води) замочують у 2-х літрах питної води кімнатної температури та витримують 1 – 2 години для активації бактерій. Підготовлений розчин задають через медикатор у систему поїння (або випоюють іншим способом залежно від технічних можливостей господарства). При використанні корму з підозрою на ураженість грибами або складній епізоотичній ситуації в господарстві, дозу пробіотика можна подвоїти.

Для застосування Імунобактерин-Д аерозольним методом у присутності тварин та птиці, за допомогою туманоутворювача холодного типу користуються таким розрахунком: на 1000 м³ застосовують 5 л розчину для аерозольного розпилювання.

Для цього необхідно:

1) розчинити 125 г Імунобактерин-Д у 2,5 л відстояної води (температура води 20 – 25⁰С), для активації бактерій розчин лишають на 1 – 3 години. Окремо розчиняють 200 мл гліцерину у 2,3 л води;

2) перед застосуванням змішують розчин гліцерину у воді та розчин активованих бактерій. Обробляють приміщення холодним туманом.

Для застосування Імунобактерин-Д дрібнодисперсним спреєм у присутності тварин та птиці користуються таким розрахунком: на 1000 м³ застосовують 5 л розчину для розпилювання.

Для цього необхідно:

1) розчинити 125 г Імунобактерин-Д у 5 л відстояної води (температура води 20 – 25⁰С), для активації бактерій розчин лишити на 1 – 3 години;

2) отриманий розчин активованих бактерій розпилюють. Після обробки приміщення придатне до експлуатації.

Побічні ефекти

Немає.

Період виведення (каренції)

Нуль днів.

Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу, які вводять засоби захисту тваринам

Необхідно дотримуватись правил роботи із ветеринарними препаратами. Максимально уникати потрапляння препарату в очі, на шкіру та одяг, використовувати індивідуальні засоби захисту – окуляри, маску, гумові рукавиці та халат. Не їсти, не пити і не палити під час і після обробки тварин.

Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним ВПІ, способи його знешкодження і утилізації

Невикористаний і протермінований препарат утилізують згідно чинного законодавства.

Термін придатності

24 місяці. Розчин препарату застосувати впродовж доби.

Умови зберігання і транспортування

Суше, темне приміщення, недоступне для сторонніх осіб за температури від 0 до 40 °С.

Упаковка

Дой-паки вагою по 1 г, 5 г, 200 г, 500 г, 1 кг – виробник 2 (фасувальник)

Дой-паки вагою 1 кг, тришарові паперові мішки з поліетиленовою вкладкою по 5, 10, 15, 20, 25 кг – виробник 1 (виробник продукції)

Назва та місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення

Приватне підприємство "Кронос Агро", 07834, Київська область, Бучанський р-н, с. Озера, вул. Шевченка, 18-Б, Україна.

Продовження Додатку 2
до реєстраційного посвідчення
№
від

Назва та місцезнаходження виробників

1. Приватне підприємство "Кронос Агро" виробник 1 (виробник продукції)
07834, Київська область, Бучанський р-н, с. Озера, вул. Шевченка, 18-Б, Україна.
2. ТОВ «ВП «Укрзооветпромпостач» – виробник 2 (фасувальник), вул. Кавказька, 1, с. Плахтянка,
Бучанський р-н., Київська обл., 08030, Україна. www.ukrzoovet.com.ua

Правила відпуску

Без рецепту.

Додаткова інформація

Якщо препарат не відповідає вимогам листівки-вкладки або виникли ускладнення, застосування цієї серії негайно припиняють і повідомляють Державний науково-дослідний інститут (ДНДІЛДВСЕ) та постачальника (виробника). Одночасно з посланцем у ДНДІЛДВСЕ направляють, відповідно до “Вказівки про порядок пред’явлення рекламаций на біологічні препарати, що призначені для застосування у ветеринарній медицині” від 03.06.98 № 2 три нерозкриті флакони цієї серії препарату за адресою 03151, м. Київ, вул. Донецька, 30, ДНДІЛДВСЕ.